

Fertilizante orgánico - Uvas



Dosis en kilogramos o litros por hectárea y por temporada de cultivo.

Demeter Alemania, Naturland Alemania Standard.

Producto	Bajo	Medio	Alto	Aplicación	Fase	Aplicaciones
BeneSOL Hairmeal*	250	375	500	Marzo - Julio	Comienzo del desarrollo de las hojas y los brotes hasta la floración	2
Feather meal 13N	250	375	500	Marzo - Julio	Comienzo del desarrollo de las hojas y los brotes hasta la floración	2
BeneSOL 4-3-3 RB**	800	1000	1400	Marzo - Agosto	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	3
BeneSOL 10-0-10	300	500	700	Marzo - Agosto	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	2 a 3
BeneSOL 8-0-14	400	600	800	Abril - Agosto	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	2 a 3
BeneLIQ 7-2-3	400	700	1000	Abril - Agosto	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	3 a 5
BeneLIQ 3-0-7	700	1000	1300	Mayo - Septiembre	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	3 a 5
BeneSTIM Recovery	2	3	4	Junio - Septiembre	Desarrollo de la hoja hasta la madurez del fruto	4 a 5

Ecovin Alemania, Demeter International Standard.

Producto	Bajo	Medio	Alto	Aplicación	Fase	Aplicaciones
BeneSOL Hairmeal*	250	375	500	Marzo - Julio	Comienzo del desarrollo de las hojas y los brotes hasta la floración	2
Feather meal 13N	250	375	500	Marzo - Julio	Comienzo del desarrollo de las hojas y los brotes hasta la floración	2
Osmo Hairmeal Plus	250	375	500	Marzo - Julio	Comienzo del desarrollo de las hojas y los brotes hasta la floración	2
BeneSOL 12.5	250	375	500	Marzo - Julio	Comienzo del desarrollo de las hojas y los brotes hasta la floración	2
BeneSOL 4-3-3	800	1000	1400	Marzo-Agosto	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	3
BeneSOL 10-0-10	300	500	700	Marzo-Agosto	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	2 a 3
BeneSOL 8-0-14	400	600	800	Abril - Agosto	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	2 a 3
BeneLIQ 7-2-3	400	700	1000	Abril - Agosto	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	3 a 5
BeneLIQ 3-0-7	700	1000	1300	Mayo - Septiembre	Desde el desarrollo temprano de las hojas y los brotes hasta el desarrollo de los frutos	3 a 5
BeneSTIM Recovery	2	3	4	Junio - Septiembre	Desarrollo de la hoja hasta la madurez del fruto	4 a 5

Las dosis mencionadas son orientativas por la expectativa media de rendimiento y pueden cambiar por diversos factores.

Entre otras cosas, influyen las condiciones biológicas y físicas del suelo, el contenido de humus y las condiciones meteorológicas regionales.

Asimismo, hay que tener en cuenta el uso de vegetación permanente y de invierno.

Todos estos factores deben tenerse en cuenta en el plan general de fertilización.

En caso de un abonado de fosfato de 30 kg de P₂O₅, utilice hasta 800 kg de BeneSOL 4-3-3 RB.

En caso de un cambio de fosfato de 30 kg de P₂O₅ a 800 kg de BeneSOL 4-3-3.

BeneSTIM Recovery no tiene la aprobación de Demeter International.

BeneSTIM Recovery se utiliza para la rehabilitación del estrés biótico y abiótico.

*estos sólo con 1 a 2 meses de antelación, con el registro 1069/2009.

**estos solo pueden ser entregados de manera directa con el registro BIO de los usuarios finales, y con una planificación de 1 a 2 meses de antelación.